

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

*Grandes cultures*

*1 - 28 mars 1988*

## LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS et les  
SUADS de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

**APIONS : infestations souvent importantes**

**PHYTONOMES : phase de montée des populations**

- 1 : en zones précoces cotières : début des traitements
- 2 : en zones tardives : intervention à prévoir dans les  
prochains jours si les températures restent élevées

Les seuils de nuisibilité de 100 adultes (apions) et de 100 larves (phytonomes) sont :

- souvent dépassés en zone côtière depuis le Narbonnais jusqu'en Camargue
- atteints ou en voie de l'être dans les zones plus tardives de l'ouest-audois et du nord-gardois.

**TRAITEZ** à l'aide d'une spécialité contenant du :

- lindane à 400-600 g/ha
- méthidation à 300 g/ha (Ultracide)

**N.B.** : des essais menés conjointement par la FNAMS et le SPV en 86 et 87 ont prouvé l'efficacité de : FASTAC (0,3 l) et KARATE (0,15 l) qui assurent une bonne protection jusqu'à 3 semaines.

**REALISEZ** le traitement après la précoupe si vous devez faire cette opération prochainement. Les dégâts sont d'autant plus à craindre que la végétation est peu développée.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD  
© Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.


(2092, 3, 4, 5)

1988.02.18



725

CHAQUE PARCELLE EST UN CAS PARTICULIER



FILET FAUCHOIR



UTILISATION DU FILET

POUR INTERVENIR A LA DATE OPTIMALE FAITES LES  
DENOMBREMENTS VOUS-MEMES DANS VOS PARCELLES  
EN UTILISANT UN FILET FAUCHOIR (5 fois 5 coups)

## **TOURNESOL : desherbage**

**CEREALES :** - fort potentiel de rouille brune  
- surveillance accrue au stade 2 noeuds

### TOURNESOL

- culture très sensible à la concurrence des mauvaises herbes jusqu'au stade 8-10 feuilles

- 1) bien connaître sa flore
- 2) bien choisir son désherbant

- Il n'existe aucun desherbage de post-levée contre les dicotyledones

- Le binage, réalisé au stade 2-3 paires de feuilles est un bon complément souvent nécessaire.

### CEREALES

- En ce début de campagne, le potentiel de Rouille Brune est très élevé et, la maladie s'observe en particulier en Camargue et bordures sur parcelles précoces de variétés sensibles (Mondur, Primadur, ou Flodur). Le Mistral de ces dernières semaines conjugué à l'absence de pluie en a bloqué l'évolution

- Surveillez vos parcelles, tout particulièrement à partir du stade 2 noeuds et traitez au besoin sur présence de nombreuses pustules sur les feuilles du bas. IMPACT T (2,6 l/ha) BAYFIDAN (0,5 l/ha) TILT 125 (1 l/ha)

# EFFICACITE DES PRINCIPAUX PROGRAMMES DE DESHERBAGE DU Tournesol

POQUES APPLICATION (/ha)			ADVENTICES														
PRE-SEMS INCORPORE	POST-SEMS PRE-LEVEE	POST-LEVEE (anti-graminées)															
TREFLAN 2,5 l puis	linuron 500 g m.a.	-	S	S	M	S	R	R		S	R	R	S	S	R	S	S
	ou CHALLENGE 600 3,5l	-	S	S	M	S	S	M	R	S	M		S	S	S	S	
	ou RACER	2 l	S	S	S	S	S	M	S	S	S	S	S	S	M	S	S
	RACER	2 l	S	S	S	S	S	M	S	S			S	S	S	M	S
	RACER	2 l	S	S	S	R	S	M	S	S	S	S	S	S		S	S
PROWL 4l puis	RACER	2 l	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S		S	S
	RACER	2 l	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	RACER	2 l	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	RACER	2 l	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DUELOR 2,2l puis	DUELOR + RACER	2,2 l 2 l	S	S	M	S	S	M	S	S		R	M	R	S	S	S
	RACER	3 l	S	S	S	M	S	S	S	S	S	M	S	R	S	S	S
	CHALLENGE 600 4,5l	-	M	S	M	R	S	R	R	S	R		S	S	R		
	LEGURAME 3 kg + RONSTAR 3 l	-		S	S	S		S		S	M	M	S	S	S	S	S
-	FERVIN 1kg + huile 3l														S	S	S
	FERVINAL 1,5 l + huile 3 l														S	S	S
	FUSILADE X2 0,75l + Agral														S	S	S
	GALLANT 1 l TARGA 1,25 l														S	S	S
-	-	-													S	S	S

: bonne efficacité

N : efficacité moyenne ou irrégulière

R : efficacité insuffisante